

Chissa kasi

Vass8R05s171-175



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


OMtp256


Chissa Kasi
8 R 5 s 171-175


chissa Kassi

FH

8 R 5 s 171-175







ANNEE 1988

NOM Chisa Kasi

EMPLACEMENT

8 R5 171-175

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	24.3	25.3	0	0							
2												
3												
4	4	21.3	25.3	0								
5			+1									

25.3

Pourriture :

Port : erige'

Vigueur : 1,5 faible

ANNEE 1989

NOM Chissa Kasi

EMPLACEMENT

8 R5 171-175

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	20.3	23.3	0	0							
2	8											
3	8											
4	8											
5	9											

Pourriture :

Mill. :

Port :

erige'

Vigueur :

1,5

1 à 23.3.89 + 5

ANNEE 1991

NOM Chisa Kasi

EMPLACEMENT 8 kg 5 1171. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f											
2	f											
3	f											
4	2	18.3	21.3 x	0								
5	2	18.3	21.3 x	0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : erige. Vigueur : 15

ANNEE 1992

NOM Chissa Kasi

EMPLACEMENT 8 R5 1171. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0								
2	f											
3	f											
4	2			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

chissa Kasi
cl 8 R5 s 171-175 (s. 474)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sêteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - ^{avec} sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sêteuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 ^{très lég. sur les N} - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ^{ou} ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 ^{ou} - sêteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 ^{très lég.} -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sêteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. ^{lég.}

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sêteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

chissa Kassi

8 R50-171-175 (s. 174)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sêteux 245 - velouté 246 - aranêeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Nocuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

chissa Rassi
8 R50- 171-175 (n. 175)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Cahier 87

Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année 2003

Observateur TD

Code cépage

Code clone

Nom cépage : chissa Kassi

Emplacement : 8 RS 171-175

Sarment

1001

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) 1 - courts (90mm) 2 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. 30

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. 10

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3

Formulaire description 5 / 8 (maturité physiologique)

Emplacement 8RS0171-175

Nom variété / introduction

Chissa kasi'

Remarques

2017: Grapillons seulement
Obs Grappes en 2018
↳ T. longue?

Observateur - Date

CM+TL 17/8/17

Code var / intro

0 Mtp 256

cm 9/8/18

GRAPPE						
Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
202 = (32)	Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : 17	très courte (<10 cm)	courte (10-14 cm)	moyenne (14-18 cm)	longue (18-25 cm)	très longue (>25 cm)
203 = (32)	Largeur Valeur absolue (en cm) : 14	très étroite (<5 cm)	étroite (5-10 cm)	moyenne (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (>20 cm)
204 = 33	Compacité	très lâche	lâche	moyenne	compacte	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	faible	moyen	fort	très fort
206 = 34	Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : 3	très court (<3 cm)	court (3-5 cm)	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (>10 cm)
207	Lignification du pédoncule	base seule.		jusqu.moitié	+ de moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	1-coloré	2-non color			
208	Forme de la grappe	1.cylindrique	2-conique	3-entonnoir		
209	Nombre d'ailes de la grappe principale	1-absentes	2- Une à deux ailes	3- trois à quatre ailes	4- cinq à six ailes	5- plus de six ailes

BAIE														
220 = (35)	Longueur Valeur absolue (en mm) : 28				très courte ($<8\text{mm}$)		courte (8-14mm)		moyenne (14-20mm)		longue (20-26mm)		très longue ($>26\text{mm}$)	
221 = (35)	Largeur Valeur absolue (en mm) : 19				très étroite ($<8\text{mm}$)		étroite (8-14mm)		moyenne (14-20mm)		large (20-26mm)		très large ($>26\text{mm}$)	
222	Uniformité de la grosseur				1-non unif.		3-uniforme							
223 = 36	Forme	1- sphériqu e aplatie	2- sphériqu e	3- elliptiqu courte	4- elliptiqu longue	5- cylindriq ue	6- troncovo ïde	7- ovoïde	8- obovoïd e	9- arquée	10- fusiform e			
225 = 37	Couleur épiderme + ocvv		1- vert jaune vert		2- rose jaune		3- rouge jaune-rosé		4- gris		5- rouge foncé violet		6- bleu noir	
226	Uniformité couleur épiderme				1- non uniforme		3- uniforme							
227	Pruine				nul ou t. fb.		faible		moyenne		forte		très forte	
228 = 39	Epaisseur pellicule				très mince		mince		moyenne		épaisse		très épaisse	
229	Ombilic (apparence)				1- peu apparent		2- apparent							
000-18	Région ombilicale (dépression)				1- déprimée		2- non déprimée							
230	Coloration de la pulpe				1-non colorée		2- colorée							
231 = 40	Intensité pigmentation anthocian. pulpe				nul ou t. fb.		faible		moyenne		forte		très forte	
232	Succulence de la pulpe				1- peu juteuse		2- moyen. juteuse		3- très jut.					
233	Rendement en jus (ml / 100g baies)						faible		moyen		élevé			
235 = 41	Fermeté de la pulpe				1- molle		2- légèrem. ferme		3-très ferme					
236 = 42	Saveur				1-aucune		2- muscatée		3- foxée		4- herbacée		5-autre	
238	Longueur pédicelle				très court ($<4\text{mm}$)		court (4-8mm)		moyen (8-12mm)		long (12-16mm)		très long ($>16\text{mm}$)	
240 = 38	Séparation du pédicelle				1- très facile		2- facile		3- difficile					

PEPINS					
241 = 43	Formation des pépins	1- absente (type corinthien)		2- rudimentaire (type sultanien)	3-complète
242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 7	très courts	courts	moyens	longs
243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) :	très faible (<10mg)	faible (25mg)	moyen (40mg)	élevé (55mg)
244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-absentes		2-présentes	

INRA Vassal

Codes OIV 2009 (= OCVV 2013)
Codes 000-internes

Virus ENR
Virus CN
Autre

Mildiou
Oïdium
Botrytis

Esca
Eutypiose
Excrosiose

Chlorose
Carence Mg
Autre

N° d'ordre :

Désignation : *Chisa kasi*

Emplacement : *8 R5 s 171.175*

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : 7 - 8 - 9
L₂/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90